

Vârsta copilului	Vaccinul	Boli prevenite	Denumirea comercială
2, 4, 11 luni	Pneumococic conjugat (PCV)	Pneumonie, meningită, septicemie, otită medie	Prevenar 13, Synflorix
2, 4, 6 luni + rapel la 12 - 15 luni	Rotavirus	Gastroenterită severă cu rotavirus	Rotarix, RotaTeq
6 - 12 luni sau peste 6 luni în fiecare toamnă	Gripă (vaccin antigripal)	Infecții gripale severe, complicații respiratorii	Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra
Doza I: la 12 luni; Doza II: la 4 - 6 ani sau la 4 - 8 săptămâni după prima doză (în funcție de recomandări)	Varicelă	Varicelă (vărsat de vânt)	Varilrix, Varivax
11 - 14 ani (2 - 3 doze în funcție de vârstă)	HPV (papilomavirus uman)	Cancer de col uterin, alte tipuri de cancer asociate HPV	Gardasil 9, Cervarix
12 luni, 5 ani, 12 ani	Meningococic (tip B și ACWY)	Meningită bacteriană, septicemie	Bexsero (tip B), Nimenrix (tip ACWY), MenQuadfi
Oricând după 12 luni	Hepatita A	Hepatită A (icter infecțios)	Havrix, Avaxim
Oricând (în special pentru adulți)	Zona Zoster (Herpes Zoster)	Zona zoster (reactivarea varicelei)	Shingrix