

Vârsta Copilului	Vaccinul	Boli Prevenite	Denumirea Comercială
2, 4, 6 luni + Rapel la 12 – 15 luni	Rotavirus	Gastroenterită severă cu rotavirus	Rotarix, RotaTeq
6 – 12 luni sau peste 6 luni în fiecare toamnă	Gripa (Vaccin antigripal)	Infecțiile gripale severe, complicații respiratorii	Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra
Doza I: la 12 luni; Doza II: la 4 – 6 ani sau la 4 – 8 săptămâni după prima doză (în funcție de recomandări)	Varicelă	Varicelă (Vărsat de vânt)	Varilrix Varivax
11 – 14 ani 2 – 3 doze în funcție de vârstă	HPV (Papilomavirus Uman)	Cancer de col uterin, alte tipuri de cancer asociate HPV	Gardasil 9, Cervarix
12 luni, 5 ani, 12 ani	Meningococ (Tip B și ACWY)	Meningita bacteriana, septicemie	Bexsero (tip B), Nimenrix (tip ACWY), MenQuadfi
Oricând după 12 luni	Hepatita A	Hepatita A (icter infectios)	Havrix, Avaxim
Oricând (în special pentru adulți)	Zona Zoster (Herpes Zoster)	Zona Zoster (reactivarea varicelei)	Shingrix